

Lumiora Deep

Relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado con lidocaína · lumiora

Composición y Propiedades

Concentración de HA reticulado	20 mg/ml
Lidocaína	0,3%
Nivel de reticulación	●●●□ (Media-alta)
Indicación principal	Corrección de arrugas y surcos moderados a severos
Agujas incluidas	25G x1 · 27G x1
Vida útil	36 meses desde fecha de fabricación
Cohesividad / Elasticidad / Plasticidad	●●● / ●●● / ●●●

Zona de aplicación ideal

Surcos y pliegues de profundidad media (surco nasogeniano, líneas de marioneta, remodelación de contorno medio-facial).

Respaldo clínico y técnico

Propiedades reológicas evaluadas frente a fillers de referencia (storage modulus / phase angle, laboratorio interno del fabricante). Eficacia y seguridad evaluadas en ensayo clínico frente a Restylane mediante la escala WSRs a 8, 16 y 24 semanas (Korea University Guro Hospital / Seoul Asan Medical Center, 2011). Producido bajo control de calidad estricto por Acmedi Korea.

- DISPOSITIVO MÉDICO CE CLASE III (CE 2265)
- Uso exclusivo por profesionales sanitarios colegiados.
- Material informativo B2B, no destinado a publicidad al público general.



Cpmbiomedical

Medical Aesthetics · Professional Distribution
Cpmbiomedical.com / +34 634 18 51 00